

鲜尔康（液体）临床上使用上的体会

1、解决霉菌毒素中毒。保肝护肝方面

现在各养殖场对饲料原料的霉菌问题都有足够的重视，一般认为自己的玉米质量还可以，或采用了添加脱霉剂等相关的预防措施。但普遍不太认可猪只出现相关症状与霉菌毒素有直接关系。针对办法：1、考察玉米存放条件，指出问题。2、指出添加脱霉剂等现有措施还不到位。

示例

待出栏育肥猪，采食发霉玉米3天后，全体不食，卧倒不起，并伴有发烧症状。

治疗方案：发病猪停料，鲜尔康+阿莫西林+芪清颗粒饮水。饮水3天后，情况基本恢复正常。继续饮水至5天。该批病猪体重并没有因本次疾病造成掉膘情况，反而比预期体重还要好一些。

保健方案：产房到保育转群时，鲜尔康饮水保健，祛除体内毒素蓄积，减少断奶应激，提高生长速度。

使用方法：1瓶混饮200-300斤水。连续饮用5-6天。注意事项：每天可在9-11点停水2个小时，11-下午4、5点，连续饮水5-6个小时。在饮水量大的阶段使用可减少浪费，并能快速饮完。

效果：猪群健康状况，生长速度明显改观。

2、外购仔猪应激

外购仔猪不到一个星期发病，影响做疫苗，伤亡率较高。

治疗方案：停料3天，鲜尔康+阿莫西林+芪清颗粒饮水

目的：解决长途运输应激，通过饮水，解除免疫抑制，保证健康的状态下，提高疫苗免疫效果。

3、由霉菌毒素（或内毒素）引起的仔猪产房腹泻

示例：猪场正常免疫腹泻疫苗，但母猪群体表（铁锈斑）出血点，泪痕情况明显。产房腹泻情况严重。怀疑腹泻苗效果不好，通过巡场指出免疫抑制的情况。

治疗方案：针对腹泻严重的母猪，口服鲜尔康100ml，仔猪灌服2头份腹泻苗，腹泻严重的口服鲜尔康5-8ml，轻微的口服3-5ml，一天3-4次，母猪，仔猪都连续使用5-7天。

效果：对脱水严重的仔猪效果不明显，对刚发生腹泻的仔猪，灌服3次后，基本再无发生腹泻的小猪。后续回访，效果较好。

4、保育阶段弱仔猪治疗

方案：鲜尔康+教保料，温水活成糊状，饲喂半月后，健康状况，体重增长情况明显改善。基本接近健康猪群水平。

5、鲜尔康配合腹泻疫苗的使用

方案：母猪做疫苗前3天，早晚各50ml/头母猪口服。

效果：回访情况，周边场发病情况严重，伤亡率高，本场也有腹泻情况发生，但很轻微，经过口服疫苗+鲜尔康饮水，没有出现仔猪伤亡情况。

总结：1、针对毒素引起的发烧，配合抗生素，停料饮水，可较快控制猪群伤亡，恢复健康

2、保肝护肝，解除肝脏中蓄积的毒素，解除免疫抑制

3、抗应激，提高疫苗效价。保证健康状况，提高生长速度。

4、解决（肝源性）仔猪腹泻，快速解除腹泻，减少伤亡，早发现，早控制，效果好。